



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 22 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO

## CESFAM PUAUCHO

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
<p><b>DEBORA NUÑEZ GARCIA</b> Enfermera Encargada de Unidad de Urgencia CESFAM Puaucho</p>  <p><b>LESLYÉ CARRILLO DUPRÉ</b> Enfermera CESFAM Puaucho</p> 	<p><b>DANIELA ESPINOZA ALMONACID</b> Encargada de Programa de Calidad y Seguridad del usuario CESFAM Puaucho</p> 	<p><b>M<sup>a</sup> DE LOS ANGELES BAHAMONDE AUBEL</b> Directora CESFAM Puaucho</p>  <p><i>Stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA, DEPTO. DE SALUD, DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA</i></p>
Fecha de elaboración: 14/08/2024	Fecha de revisión: 22/08/2024	Fecha de aprobación: 27/08/2024



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 2 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

## INDICE

1. INTRODUCCION	03
2. OBJETIVO GENERAL	03
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS	03
4. ALCANCE	04
5. RESPONSABLES	04
6. DEFINICIONES	05
7. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	07
8. INDICADOR	18
9. BIBLIOGRAFÍA	19
10. DISTRIBUCION	19
11. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO	19
12. ANEXOS	20



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 3 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

## 1. INTRODUCCION.

La introducción de un catéter en la vía urinaria, conlleva un alto riesgo de infecciones del tracto urinario (ITU) en los pacientes, por lo que es importante tomar las medidas de resguardo, seguridad y prevención durante todo el proceso de instalación.

La incidencia de las ITU están asociadas a uso de catéter urinario a permanencia, por lo tanto, es importante establecer estrategias destinadas a limitar el uso, duración y mantención adecuada del Cateterismo Urinario (CU), siendo éstas medidas efectivas, en la reducción de la incidencia de infecciones asociadas a este dispositivo, permitiendo así la entrega de una atención de salud que favorezca la calidad y seguridad del paciente.

## 2. OBJETIVO GENERAL.

Estandarizar la instalación y mantención del catéter urinario, estableciendo la técnica y manipulación correcta, para prevenir y controlar las infecciones asociadas a su uso y permanencia.

## 3. OBJETIVO ESPECIFICO.

Minimizar la incidencia de infecciones del tracto urinario asociadas a Catéter Urinario a Permanencia



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 4 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años


#### 4. ALCANCE.

- **Ámbito de aplicación:** Procedimiento aplicable a profesionales y TENS que se encuentren capacitados técnicamente para realizar la instalación de CUP, lo cual se pueden desarrollar en Box de Procedimientos, atenciones en domicilios y/o Unidad de Urgencia del CESFAM Puaucho y establecimientos dependientes.
- **Población de aplicación:** Protocolo aplicable a todos los usuarios/as, atendidos en el CESFAM Puaucho y establecimientos dependientes, que requiera instalación y manejo de catéter urinario.

\*\* Queda excluida Posta de Chamilco por depender técnicamente del Hospital Fūta Srūka Lawenche Kūnko Mapu Mo.

#### 5. RESPONSABLES.

Dirección CESFAM Puaucho	Velar por el cumplimiento del presente protocolo.
Encargada del Programa de Calidad y Seguridad del Usuario	Supervisar que se estén llevando a cabo las evaluaciones del presente protocolo.
Enfermera Encargada de IAAS	Evaluar el cumplimiento del presente protocolo.
Enfermera Encargada de Unidad de Urgencia.	Difundir el presente protocolo en sus Unidades a cargo.
Enfermera Encargada de Box de	Supervisar que las acciones descritas en el presente protocolo se cumplan en sus unidades a cargo.

	<b>PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO</b> <b>CESFAM PUAUCHO</b>	COD: GCL-1.3.1
		Versión: 01
		Página 5 de 22
		Fecha de emisión: Agosto 2024
		Vigencia: 5 años

<b>Procedimientos.</b>	Capacitar a TENS de sus Unidades.  Elaborar Plan de Mejora cuando corresponda.
<b>Médicos</b>  <b>Enfermeras</b>  <b>Matronas</b>	Ejecutar las acciones descritas en el presente protocolo.
<b>TENS capacitados</b>	Colaborar en las tareas asignadas

## 6. DEFINICIONES.

- **CATETERISMO INTERMITENTE:** Consiste en el drenaje de la vejiga por medio de un catéter introducido por la uretra, que se indica sólo para extraer orina y se retira posterior al procedimiento.
- **CATETERISMO TRANSITORIO:** Consiste en el drenaje de la vejiga por medio de un catéter introducido por la uretra, que se deja instalado por el tiempo que indica el Medico menor a 24 horas.
- **CATETERISMO PERMANENTE:** Consiste en el drenaje de la vejiga por medio de un catéter introducido por la uretra, que se deja por un tiempo que indique el Medico, superior a 24 horas.
- **CESFAM:** Centro de Salud Familiar.
- **CUP:** Catéter urinario a permanencia.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1


Versión: 01

Página 6 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

- **DAU:** Datos de Atención de Urgencia.
- **INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS):** Corresponden a todo proceso infeccioso general o localizado que ocurre como consecuencia de la atención de salud y que no estaba presente ni incubándose al momento de la atención.
- **ITU:** Infección del tracto urinario confirmado por determinados criterios diagnósticos (clínicos y/o microbiológicos)
- **ITU/CUP:** Infección urinaria asociada al catéter urinario permanente.
- **ITU/CUP (IAAS):** Se define como ITU asociada a la atención de salud, a toda infección urinaria no presente al momento de la instalación del catéter urinario a permanencia y que se desarrolla después de 48 horas posterior a su instalación, y que cumpla con los criterios establecidos por el MINSAL.
- **TENS:** Técnico en Enfermería Nivel Superior.

	<b>PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO</b> <b>CESFAM PUAUCHO</b>	COD: GCL-1.3.1
		Versión: 01
		Página 7 de 22
		Fecha de emisión: Agosto 2024
		Vigencia: 5 años

## 7. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

### 7.1. INDICACIÓN DE CATETERISMO URINARIO.

La cateterización urinaria se debe realizar por indicación médica consignada en la ficha clínica o en DAU.


#### 7.1.1. LOS CRITERIOS MÉDICOS DE INDICACIÓN DE CATETERISMO URINARIO.

- Obstrucción del tracto urinario (Globo vesical, Anuria).
- Hematuria severa por riesgo de obstrucción secundaria a coágulos
- Toma de muestra de orina con técnica estéril.
- En forma excepcional en pacientes con vejiga neurogénica (se prefiere el cateterismo intermitente).

### 7.2. INSTALACIÓN DE CATETERISMO URINARIO.

#### 7.2.1. PERSONAL RESPONSABLE.

- **OPERADOR:** Enfermera- Matrona - Medico
- **ASISTENTE:** TENS

	<b>PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO</b>  <b>CESFAM PUAUCHO</b>	COD: GCL-1.3.1
		Versión: 01
		Página 8 de 22
		Fecha de emisión: Agosto 2024
		Vigencia: 5 años

### 7.2.2. ASEO GENITAL.

Precede a todos los procedimientos de cateterismo, con el objetivo de disminuir la flora bacteriana normal y eliminar la transitoria de la región genital externa, antes de realizar un procedimiento invasivo en la vía urinaria del paciente.

En el caso de paciente femenino, se debe lavar los genitales separando cuidadosamente los labios mayores, con una tórula o compresa humedecida en agua tibia y limpiando de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás (solo en una dirección y eliminar) de lo más limpio a lo más sucio. Repetir el procedimiento con otra tórula o compresa hasta que la superficie este visiblemente limpia. Enjuague con abundante agua.

Si el paciente es masculino, se debe retraer el prepucio y lavar con tórula o compresa humedecida en agua tibia desde dentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, enjuagar con agua.

#### 7.2.2.1. MATERIALES PARA EL ASEO GENITAL.

- Jabón neutro (si fuese necesario)
- Chata
- Jarra con agua tibia
- Bandeja o riñón
- Guantes de procedimiento
- Pechera desechable
- Tórulas o compresas.
- Bolsa de desechos



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 9 de 22


Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

#### 7.2.2.2. PROCEDIMIENTO DE ASEO GENITAL.

Este procedimiento debe ser realizado por TENS.

- 1) Realizar lavado clínico de manos.
- 2) Colocarse pechera desechable.
- 3) Colocarse guantes de procedimiento.
- 4) Colocar chata bajo zona glútea.
- 5) Verter agua tibia sobre la parte externa de los genitales
- 6) Realizar el aseo con técnica de arrastre, separar los labios mayores con una mano y con la otra lavar los pliegues entre los labios mayores y menores, de arriba hacia abajo en pacientes mujeres y retrayendo el prepucio hacia atrás en los hombres, volviendo el prepucio a su posición para evitar edema y lesiones.
- 7) Limpiar zona rectal desde vagina al ano, en un solo sentido; limpiar parte inferior del escroto y región anal.
- 8) Enjuagar con agua tibia las veces que sea necesario.
- 9) Secar suavemente zona genital desde el pubis hacia región anal.
- 10) Retirar chata y eliminar residuos según corresponda (REAS).
- 11) Retirar guantes.
- 12) Realizar lavado clínico de manos.

	<b>PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO</b> <b>CESFAM PUAUCHO</b>	COD: GCL-1.3.1
		Versión: 01
		Página 10 de 22
		Fecha de emisión: Agosto 2024
		Vigencia: 5 años

### 7.2.2.3. CONSIDERACIONES DEL ASEO GENITAL.

- Lavar los genitales solo con agua, salvo que las condiciones higiénicas, sean precarias. Si utiliza jabón debe ser neutro, nunca con clorhexidina ya que este antiséptico irrita las mucosas favoreciendo la colonización.
- El tiempo existente entre el aseo genital y la instalación del catéter urinario no debe exceder los 30 minutos, de lo contrario se debe repetir el aseo. En lo posible debe ser realizado inmediatamente antes del cateterismo.

### 7.2.3. CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE.

Realizar aseo genital previo al procedimiento

#### 7.2.3.1. MATERIALES PARA EL CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE.

- Paño perforado estéril.
- Riñón estéril.
- Guantes estériles.
- Catéter urinario de lumen según criterio clínico
- Lubricante estéril (agua bidestilada estéril)



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 11 de 22


Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

### 7.2.3.2. PROCEDIMIENTO CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE.

Este procedimiento debe ser realizado por profesional descrito, con el apoyo de un TENS

- 1) Informar al paciente o familiares del procedimiento a realizar.
- 2) Solicitar al TENS que realice aseo genital previo a procedimiento al menos 30 minutos antes.
- 3) Realizar lavado clínico de manos, reunir materiales, colocar al paciente en posición cómoda y otorgarle la privacidad necesaria.
- 4) Realizar lavado clínico de manos.
- 5) Colocarse guantes estériles correctamente (operador).
- 6) Asistente presenta campo estéril a operador.
- 7) Operador posiciona campo estéril sobre zona pública, asegurándose de que este le permita realizar las maniobras sin contaminar los materiales.
- 8) Asistente presenta catéter urinario al operador.
- 9) Asistente ofrece al operador lubricante.
- 10) Preparar el catéter, lubricando el extremo que se introduce en la uretra.
- 11) Introducir el catéter hasta que refluya la orina.
- 12) Vaciar orina en el riñón estéril.
- 13) Operador retira catéter urinario completamente.

	<b>PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO</b> <b>CESFAM PUAUCHO</b>	COD: GCL-1.3.1
		Versión: 01
		Página 12 de 22
		Fecha de emisión: Agosto 2024
		Vigencia: 5 años

14) Acomodar al paciente.

15) Solicitar al TENS que mida el volumen de orina (ml).

16) En los varones, verificar que el prepucio quede en posición fisiológica, al finalizar el procedimiento, para evitar complicaciones.

17) Retirar los equipos usados y desechos

18) Retirar los guantes.

19) Realizar lavado clínico de manos.

#### **7.2.4. CATETERISMO URINARIO PERMANENTE.**

Realizar aseo genital previo al procedimiento, al menos 30 minutos antes.

##### **7.2.4.1. MATERIALES PARA EL CATETERISMO URINARIO PERMANENTE.**

- Paño perforado estéril.
- Riñón estéril.
- Guantes estériles.
- Catéter urinario de lumen según criterio clínico o indicación.
- Lubricante estéril (agua bidestilada estéril)
- Jeringa estéril.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 13 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

- Bolsa recolectora de orina.
- Tela adhesiva.
- Agua bidestilada para inflar cuff

#### 7.2.4.2. PROCEDIMIENTO CATETERISMO URINARIO PERMANENTE.

Este procedimiento debe ser realizado por profesional descrito, con el apoyo de un TENS

- 1) Informar al paciente o familiares del procedimiento a realizar.
- 2) Solicitar al TENS que realice aseo genital previo a procedimiento al menos 30 minutos antes
- 3) Realizar lavado clínico de manos, reunir materiales, colocar al paciente en posición cómoda y otorgarle la privacidad necesaria.
- 4) Realizar lavado clínico de manos.
- 5) Colocarse guantes estériles correctamente (operador).
- 6) Asistente presenta campo estéril a operador.
- 7) Operador posiciona campo estéril sobre zona púbica, asegurándose de que este le permita realizar las maniobras sin contaminar los materiales.
- 8) Asistente presenta catéter urinario al operador.
- 9) Operador comprueba funcionamiento del cuff.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1


Versión: 01

Página 14 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

- 10) Asistente ofrece al operador lubricante.
- 11) Preparar el catéter urinario, lubricando el extremo que se introduce en la uretra.
- 12) Introducir el catéter hasta que refluya la orina.
- 13) Inflar el cuff con agua bidestilada, con el volumen que recomienda el fabricante
- 14) Traccionar suavemente la sonda con el objetivo de comprobar que cuff se encuentre inflado dentro de la vejiga.
- 15) En usuarios de sexo masculino verificar que el prepucio quede en posición fisiológica
- 16) Comprobar que el recolector de orina se encuentre con la válvula de salida cerrada.
- 17) Instalar circuito cerrado de recolección de orina sin contaminar.
- 18) Fijar el catéter al muslo del paciente con tela adhesiva, haciendo un asa, para evitar desplazamiento o tracción del catéter.
- 19) Verificar la permeabilidad del recorrido, evitando que la sonda se acode, aplaste o tuerza.
- 20) Mantener recolector de orina bajo el nivel de la vejiga.
- 21) Acomodar al paciente.
- 22) Retirar los equipos usados y desechos
- 23) Retirar los guantes.
- 24) Realizar lavado de manos clínico.

	<p>PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO</p> <p>CESFAM PUAUCHO</p>	COD: GCL-1.3.1
		Versión: 01
		Página 15 de 22
		Fecha de emisión: Agosto 2024
		Vigencia: 5 años

25) Realizar registro del procedimiento, describiendo: calibre del catéter, capacidad y fijación del cuff, fijación al muslo y otros detalles relevantes durante el desarrollo de la actividad.

### 7.3. CUIDADOS DEL CATÉTER URINARIO.

- Educar a paciente sobre cuidados que debe realizar en domicilio.
- Observar si existen filtraciones de orina, hematuria, presencia de coágulos, piuria, anuria u otro síntoma de alteración urinaria.
- Nunca traccionar catéter urinario.
- Se debe mantener el circuito cerrado y permeable en forma permanente.
- Se debe mantener el flujo urinario sin obstrucción y la bolsa recolectora bajo el nivel de la vejiga, y nunca tocar el suelo.
- La bolsa recolectora se debe vaciar y medir a intervalos regulares, su nivel de llenado no debe exceder más de  $\frac{3}{4}$  de su capacidad.
- Rotar la fijación para evitar maceraciones y lesiones por presión



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 16 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

#### 7.4. CUIDADOS DE LA ZONA GENITAL.

- La zona genital debe mantenerse limpia, realizando aseo genital al menos dos veces al día y cada vez que sea necesario, de acuerdo a la presencia de suciedad visible.
- En pacientes con lesiones en la zona periuretral, se deben realizar los aseos genitales con mayor frecuencia.

#### 7.5. EVALUACIÓN.

- La Enfermera Encargada de IAAS, es la responsable de realizar evaluación periódica de los procedimientos en Unidad de Urgencia, domicilios y/o Box de Procedimientos.
- La evaluación se realiza por medio de la aplicación de las PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE (ANEXO N° 1) y PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATETERISMO URINARIO PERMANENTE (ANEXO N° 2).
- La periodicidad de aplicación de las pautas es según oportunidad.
- La Enfermera Encargada de IAAS, debe realizar un informe semestral de los resultados obtenidos y los indicadores y presentarlo a jefaturas de las Unidades evaluadas, Encargada de Calidad y Seguridad del Usuario y Dirección del establecimiento.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 17 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

- La Encargada de Calidad y Seguridad del Usuario, realizará análisis de los datos presentados, evaluará indicador y en caso de ser necesario solicitará a las jefaturas de las Unidades evaluadas, un Plan de Mejora.



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 18 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

## 8. INDICADOR.

<b>Código de la característica</b>	GCL-1.3.1
<b>Título</b>	Porcentaje de instalaciones de catéter urinario evaluados, que cumplen con los criterios de supervisión.
<b>Justificación</b>	Estandarizar la instalación y mantención del catéter urinario, estableciendo la técnica y manipulación correcta, para prevenir y controlar las infecciones asociadas a su uso y permanencia.
<b>Tipo de indicador</b>	Proceso
<b>Dimensión</b>	Seguridad.
<b>Fórmula</b>	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ procedimientos que cumplen con la técnica instalación de CU}}{\text{Total de instalaciones evaluadas en el periodo}} \right) \times 100$
<b>Umbral de cumplimiento</b>	$\geq 90\%$
<b>Fuente de datos</b>	Pautas de evaluación (ANEXO N° 1 y N° 2)
<b>Muestreo recomendado</b>	Prevalencia
<b>Metodología</b>	Universo de pacientes que cuenten con indicación médica para cambiar y/o instalar catéter urinario.
<b>Periodicidad</b>	<b>De la Medición:</b> Según oportunidad. <b>Del Reporte:</b> Semestral.
<b>Áreas de aplicación</b>	Unidad de Urgencia. Box de Procedimientos. Domicilio.
<b>Responsables</b>	Enfermera Encargada de IAAS.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 19 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

## 9. BIBLIOGRAFÍA.

- Norma General Técnica N°95 de Prevención de Infecciones del Tracto Urinario Asociadas al uso del Catéter Urinario Permanente, MINSAL 2007.
- Protocolo de Instalación de Catéter Urinario, Hospital Base San José Osorno, 2018.

## 10. DISTRIBUCIÓN.

- Dirección CESFAM Puaucho.
- Encargados/as de Sector.
- Postas y Estaciones Medico Rurales.
- Enfermeras, matronas y médicos de Cesfam Puaucho
- Unidad de Urgencia.
- Box de Procedimientos.
- Disponible de manera virtual en INTRANET de página web [www.saludsanjuan.cl](http://www.saludsanjuan.cl) para todos los funcionarios del CESFAM Puaucho y establecimientos dependientes.

## 11. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO.

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Agosto 2024	01	Elaboración del documento.	Enfermera Encargada de IAAS.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 20 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

**12. ANEXO N°1: PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE**



Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa  
Departamento de Salud Municipal  
Centro de Salud Familiar Puaucho

**PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE**

FECHA		
ESTAMENTO		
UNIDAD		
DAU O RUT DE USUARIO		
REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO
1. Realiza lavado clínico de manos.		
2. Reúne los materiales para el procedimiento.		
3. Verifica que el/la TENS haya realizado aseo genital previo al menos 30 minutos antes		
4. Realiza lavado clínico de manos.		
5. Se coloca correctamente los guantes estériles.		
6. Posiciona campo estéril de manera correcta, permitiendo que se realicen maniobras, sin contaminar los materiales.		
7. Prepara el catéter, lubricando el extremo que se introduce en la uretra.		
8. Introduce el catéter en meato urinario con técnica aséptica.		
9. Comprueba salida de orina posterior a ingreso del catéter.		
10. Vacía orina en el riñón estéril.		
11. Retira catéter.		
12. Realiza retiro de guantes.		
13. Realiza lavado clínico de manos.		
CUMPLE: SI/NO		
IDENTIFICACIÓN EVALUADOR		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 21 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

**ANEXO N° 2: PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATETERISMO URINARIO PERMANENTE**



Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa  
Departamento de Salud Municipal  
Centro de Salud Familiar Puaucho

**PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATETERISMO URINARIO PERMANENTE**

FECHA		
ESTAMENTO		
UNIDAD		
DAU O RUT DE USUARIO		
REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO
1. Realiza lavado clínico de manos		
2. Reúne los materiales para el procedimiento.		
3. Verifica que el/la TENS haya realizado aseo genital previo al menos 30 minutos antes		
4. Realiza lavado clínico de manos.		
5. Se coloca correctamente los guantes estériles.		
6. Posiciona campo estéril de manera correcta, permitiendo que se realicen maniobras, sin contaminar los materiales.		
7. Comprueba funcionamiento del cuff.		
8. Prepara el catéter, lubricando el extremo que se introduce en la uretra.		
9. Introduce catéter en meato urinario y comprueba salida de orina.		
10. Se infla cuff con agua bidestilada		
11. Tracciona suavemente la sonda con el objetivo de comprobar que cuff se encuentre inflado dentro de la vejiga.		
12. Comprueba que el recolector de orina se encuentre con la válvula de salida cerrada		
13. Instala circuito cerrado de recolección de orina sin contaminar.		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 22 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

14. Fija catéter a muslo, haciendo un asa.		
15. Verifica la permeabilidad del recorrido.		
16. Mantiene bolsa recolectora de orina bajo nivel de la vejiga.		
17. Realiza retiro de guantes.		
18. Realiza lavado clínico de manos.		
CUMPLE: SI /NO		
IDENTIFICACIÓN EVALUADOR		